



DLP 19-12-88175604

## AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
Rue Saint-Jean • BP 19 • 31131 BALMA CEDEX  
Tél. 61. 24. 06. 51

Régisseur de Recettes  
D.R.A.F. "MIDI-PYRÉNÉES"  
CCP : 8618-62 Y Toulouse  
I.S.S.N. : 0752-2053

PUBLICATION PERIODIQUE

ABONNEMENT ANNUEL : 130 F

BULLETIN N° 20 DU 18 NOVEMBRE 1988

## COLZA

Stades  
végétatifs

Ils sont extrêmement variables compte tenu de la situation particulière de l'automne (levées échelonnées à cause de la sécheresse, semis d'un grand nombre de parcelles).  
Ils vont du stade cotylédonaire à 6-8 feuilles, avec parfois un échelonnement des divers stades intermédiaires dans une même parcelle.

PUCERONSSituation

Dans les cultures présentant plusieurs feuilles, on observe de fréquentes colonies de deux espèces de pucerons :

- surtout du puceron du chou caractérisé par une pulvérulence blanchâtre sur le corps, *Brevicoryne brassicae*.
- plus rarement une autre espèce de puceron, vert olive à jaune sale, *Lipaphis erisimi*.

Préconisation

Une intervention insecticide est conseillée contre le puceron cendré du chou lorsqu'on observe une plante sur cinq colonisée par cette espèce.

Produits utilisables :

- |                                      |                        |             |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|
| - fluvalinate                        | MAVRIK                 | à 0,2 l/ha  |
| - phosalone                          | nombreuses spécialités | à 1,2 l/ha  |
| - pyrimicarbe                        | PIRIMOR G - APHOX      | à 0,5 kg/ha |
| - association endosulfan + thiométon | SERK                   | à 1,5 l/ha  |

## CEREALES

Stades  
végétatifs

Quelques rares parcelles levées au stade 1 à 2 feuilles (semis du 24 au 29 Octobre, faisant suite à la pluie de 10 à 15 mm en moyenne observée les 19 et/ou 20 Octobre dans la région).

Pas de levée observée sur semis réalisés à partir de Novembre.

Les semis ne sont pas encore terminés dans un grand nombre de situations.

JAUNISSE NANISANTE DE L'ORGESituation

Quelques faibles colonies de pucerons sont signalées dans les rares cultures levées. Moins de 5 % de pieds colonisés par les pucerons sont observés dans ces situations.

Préconisation

Toute intervention insecticide dirigée contre les pucerons est actuellement inutile.

## MAIS

PYRALE - SESAMIE

Afin de limiter les attaques de ces ravageurs lors de la prochaine campagne, il est conseillé de broyer les cannes de maïs dès la récolte terminée.

Ce broyage pourra être utilement complété par le passage d'outils tels que le rotovator ou le couverts.

\* \* \*

725